Information aux usagers : Le DSRC OncoPaca-Corse décline sa responsabilité concernant les contenus publiés sur d'autres sites web prétendant être liés à notre structure ou utilisant sans autorisation, en tout ou partie, nos dénominations, noms de domaine et marques "OncoPaca" et "OncoPaca-Corse".

FBP Dasatinib - Suivi des patients sous thérapie orale en OncoHématologie

Thématique:
Onco-Hématologie
Pathologie:
Hématologie
Auteur:
OncoPaca-Corse, Dispositif Spécifique Régional du Cancer
Type de document:
Fiches et documents pour la pratique
Profil:
Acteurs de Santé de Ville
Médical - Oncologie
Paramédical
Mot(s) clef(s):
Fiches et documents pratiques (Pro)
Sous-titre du document:
Fiche de Bonnes Pratiques
Illustration en remplacement:

Groupe de travail régional SUD Paca Corse ONCO-HEMATOLOGIE

Suivi des patients sous thérapie orale en onco-hématologie : DASATINIB

PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE 1er RECOURS

FICHE DE BONNES PRATIQUES

Onco-hématologue / équipe référente

. . . . . .

. . . . . .

Les professionnels de 1er recours trouveront dans cette fiche une aide au dépistage précoce des effets indésirables potentiels (EI), des propositions de gestion de ces EI, et les principales interactions médicamenteuses à prendre en compte.

ATTENTION : Cette fiche est un outil d'aide à la pratique mis à disposition à titre indicatif. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical ou/et pharmaceutique spécialisé.

I Informations générales

- **Mode d'action :** inhibiteur de tyrosine kinase ciblant BCR-ABL.
- Posologie établie par le médecin prescripteur : **ne jamais arrêter le traitement ni modifier le rythme d'administration sans son avis.**
- La prise du traitement pendant le repas, quand elle est possible, permet d'atténuer les effets indésirables digestifs.
- Si le dasatinib est prescrit en une prise par jour, une prise le soir pourrait également limiter l'intensité du ressenti des effets digestifs.
- Les comprimés pelliculés ne doivent pas être écrasés, coupés ou mâchés.
- Le dasatinib ne doit pas être pris avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.
- Si une dose a été oubliée, ou en cas de vomissement après la prise, la dose suivante devra se faire à l'horaire habituel, sans être doublée.

Les patients devront être informés de possibles effets indésirables tels que sensations vertigineuses, troubles visuels ou somnolence. **La prudence est donc recommandée pour les utilisateurs de véhicules ou de machines.**

II Surveillance particulière

SURVEILLANCE CLINIQUE

- **AVANT UN GESTE INVASIF,** discuter avec l'onco-hématologue de la suspension éventuelle du traitement (thrombopénie possible).

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

- **HÉMOGRAMME :** 1 fois/semaine le 1er mois, 1 fois/15 jours les 2ème et 3ème mois, 1 fois/3 mois ensuite.
- **BILAN HÉPATIQUE** (ALAT, ASAT) **ET RÉNAL** (créatinine) régulier.
- **KALIÉMIE, MAGNÉSÉMIE, CALCÉMIE :** Si patient à risque, en cas d'association avec un traitement allongeant le QT, ou favorisant l'arythmie, ou diurétique hypokaliémiant, ou diarrhée, vomissements, etc.
- **PHOSPHATÉMIE** (surveiller et supplémenter en vitamine D), **CRÉATINE PHOSPHOKINASE** (éliminer une rhabdomyolyse).

SURVEILLANCE RENFORCÉE

- Ce traitement nécessite une étroite **SURVEILLANCE CARDIAQUE CHEZ LES PATIENTS PORTEURS D'INSUFFISANCE CARDIAQUE,** en raison des effets hydrosodiques du dasatinib.
- Toute association avec un traitement susceptible d'**ALLONGER L'ESPACE QT** doit faire renforcer la surveillance cardiaque (ECG).
- Les patients de **65 ANS ET PLUS** sont plus sujets aux effets indésirables les plus fréquents, et ils sont plus susceptibles de développer des effets indésirables moins fréquents : ils doivent être étroitement surveillés.
- **VHB :** tous les patients doivent faire l'objet d'un **DÉPISTAGE** d'infection par le VHB avant l'initiation d'un traitement par dasatinib, puis faire l'objet d'une **SURVEILLANCE SÉROLOGIQUE VHB RÉGULIÈRE.** Les patients porteurs du VHB et traités par dasatinib doivent être **ÉTROITEMENT SURVEILLÉS** tout au long du traitement et plusieurs mois après son arrêt.

VACCINATIONS : les vaccinations prophylactiques sont décidées par l'onco-hématologue référent.

Pour plus d'informations sur les soins de support, consulter les sites oncopacacorse.org et prosinfoscancer.org

© ORS Onco Paca Corse 2021 - FBP Onco-hématologie - personnelles - DR : Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique

Date de mise en ligne:
Mercredi, septembre 15, 2021
Fichier:
dasatinib-fbp-oncohemato-oncopacacorse-2021.pdf
Date de parution:
Mercredi, septembre 15, 2021