Information aux usagers : Le DSRC OncoPaca-Corse décline sa responsabilité concernant les contenus publiés sur d'autres sites web prétendant être liés à notre structure ou utilisant sans autorisation, en tout ou partie, nos dénominations, noms de domaine et marques "OncoPaca" et "OncoPaca-Corse".

FBP Imatinib - Suivi des patients sous thérapie orale en OncoHématologie

Thématique:
Onco-Hématologie
Pathologie:
Hématologie
Auteur:
OncoPaca-Corse, Dispositif Spécifique Régional du Cancer
Type de document:
Fiches et documents pour la pratique
Profil:
Acteurs de Santé de Ville
Médical - Oncologie
Paramédical
Mot(s) clef(s):
Fiches et documents pratiques (Pro)
Sous-titre du document:
Fiche de Bonnes Pratiques
Illustration en remplacement:

Groupe de travail régional SUD Paca Corse ONCO-HEMATOLOGIE

Suivi des patients sous thérapie orale en onco-hématologie : IMATINIB

PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE 1ER RECOURS

FICHE DE BONNES PRATIQUES

Onco-hématologue / équipe référente

. . . . . .

. . . . . .

Les professionnels de 1er recours trouveront dans cette fiche une aide au dépistage précoce des effets indésirables potentiels (EI), des propositions de gestion de ces EI, et les principales interactions médicamenteuses à prendre en compte.

ATTENTION : Cette fiche est un outil d'aide à la pratique mis à disposition à titre indicatif. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical ou/et pharmaceutique spécialisé.

I Informations générales

- **Mode d'action :** inhibiteur de tyrosine kinase ciblant BCR-ABL.
- Posologie établie par le médecin prescripteur : **ne jamais arrêter le traitement ni modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**
- Médicament à prendre avec un grand verre d'eau, de préférence avec un aliment, ou au cours des repas (atténue les effets indésirables digestifs) ; si 1 prise par jour, éviter la prise le soir en cas de gastralgies.
- Les comprimés peuvent être dispersés dans un verre d'eau plate ou de jus de pomme.
- Si une dose a été oubliée, prendre la dose si retard < à 12h (ou < à 6h si 2 prises par jour) ; si retard suppérieur, la dose oubliée ne doit pas être prise ; le traitement doit être continué selon la posologie habituelle.

Les patients devront être informés de possibles effets indésirables tels que sensations vertigineuses, troubles visuels ou somnolence au cours du traitement par l'imatinib. **La prudence est donc recommandée pour les utilisateurs de véhicules ou de machines.**

II Surveillance particulière

SURVEILLANCE CLINIQUE

- Prise de tension hebdomadaire le 1er mois puis régulière.

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

- **HÉMOGRAMME :** 1 fois/semaine le 1er mois, 1 fois/15 jours les 2ème et 3ème mois, 1 fois/3 mois ensuite
- **BILAN HÉPATIQUE** (transaminases, bilirubine, phosphatases alcalines) **ET RÉNAL** (créatinine, attention particulière aux patients avec facteurs de risque d'altération de la fonction rénale).

SURVEILLANCE RENFORCÉE

- **SI INSUFFISANCE CARDIAQUE** (risque d'aggravation des effets hydrosodiques).
- **SI DIABÈTE :** dosage régulier de la glycémie (risque d'hypoglycémie).
- **VHB :** Tous les patients doivent faire l'objet d'un **dépistage** d'une infection par le VHB avant l'initiation d'un traitement par dasatinib, puis faire l'objet d'une **surveillance sérologique VHB régulière.** Les patients porteurs du VHB et traités par dasatinib doivent être **étroitement surveillés** tout au long du traitement et plusieurs mois après son arrêt. (Cf alerte ANSM: https://ansm.sante.fr/)

VACCINATIONS : les vaccinations prophylactiques sont décidées par l'onco-hématologue référent.

Pour plus d'informations sur les soins de support, consulter les sites oncopacacorse.org et prosinfoscancer.org

© RRC OncoPaca-Corse 2021 - FBP Onco-hématologie - personnels de santé - DR : Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique

Date de mise en ligne:
Mercredi, septembre 15, 2021
Fichier:
imatinib-fbp-oncohemato-oncopacacorse-2021.pdf
Date de parution:
Mercredi, septembre 15, 2021